

<b>CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁR HELY - MAKÓ</b>	Betegtájékoztató
	<b>INTRAVÉNÁS KONTRASZTANYAG ADÁS CSÖKKENT VESEFUNKCIÓJÚ BETEGEK SZÁMÁRA</b>

## Kedves Betegünk!

**Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!**

*Az Ön esetében „**Intravénás kontrasztanyag adás**”-t szükséges elvégezni!  
A beavatkozás elvégzése érdekében szeretnénk önt tájékoztatni a vizsgálat,  
fontos feltételeiről és a vizsgálat előtti teendőiről!*

### 1. A beavatkozás célja:

A tervezett intravénás kontrasztos CT vizsgálat célja, hogy az előzetes kivizsgálással felmerült eltérést kontrasztos CT vizsgálattal pontosabban megítéljék.

A vénás kontrasztanyag adásával a CT vizsgálat során érzékenyítik a képalkotó vizsgálatot, majd a Radiológiai osztály munkatársai felvételek sorozatát készítik el a vizsgált régióról. Az előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján igazolódott, hogy Önnek csökkent vesefunkciója van. Az Ön esetében a vénájába adott jódos kontrasztanyag adása után a már a vizsgálat előtt meglévő csökkentebb vesefunkciója a kontrasztanyag miatt esetlegesen tovább csökkenhet. Ez az esetek egy kisebb részében klinikai tünetekben is megnyilvánulhat, és célzott kezelést tehet szükségessé, ritkán súlyosabb veseműködési zavar is felléphet. Legsúlyosabb esetben a veseműködés átmeneti pótlására is szükség lehet dialízissel. A legtöbb esetben azonban a vesefunkció átmeneti csökkenése nem jelentős és semmilyen klinikai tünetben nem nyilvánul meg. A vizsgálatot kérő szakorvos csak akkor fogja javasolni Ön számára az intravénás kontrasztanyag vizsgálatot, amennyiben az azzal nyerhető orvosi információ tartalma jelentősen meghaladja a kontrasztanyag által előidézett, legtöbbször átmeneti vesefunkció romlás okozta szövődmények valószínűségét. A fentebb jelzett veseműködési zavarok elkerülése céljából megelőző intézkedések szükségesek, melyek csökkentik, illetve megelőzik a vesefunkció romlásának valószínűségét. A megelőző intézkedésekkel kapcsolatban a vizsgálatot kérő szakorvosa részletesen tájékoztatja majd Önt. Ennek részeként szükség lehet bizonyos gyógyszerek átmeneti felfüggesztésére is, melyre vonatkozóan vagy a vizsgálatot kérő szakorvos, vagy a gyógyszert korábban indikáló szakorvos tesz majd javaslatot, illetve ad felvilágosítást. A kihagyandó gyógyszerek közül kiemelkedő jelentőségűek a metformin tartalmú, cukorbetegség ellenes gyógyszerek, melyeket a vizsgálat előtt 48 órával el kell hagyni, illetve a vizsgálat után 48 óráig nem szedhetők. A preventív intézkedések sarkköve a vizsgálat előtti 12 órában adott intravénás folyadék alkalmazása, melyre a vizsgálat előtt Önnek kórházunk egyik fekvőbeteg osztályán biztosítunk lehetőséget. Az infúziós terápia célja, hogy az intravénás kontrasztanyag képző vizsgálat előtt szervezetében megfelelő mennyiségű folyadék legyen a vesék folyadékáramlásának fenntartása, illetve megőrzése céljából. A megelőző kezelés része néhány szájon keresztül is szedhető gyógyszer alkalmazása, melyek a vese kontrasztanyag adásakor fellépő károsodásának kivédését szolgálják. Ilyen gyógyszerek az acetylcystein és az atorvastatin, melyek általában kedvező mellékhatás profillal bírnak és jelentős mellékhatást általában nem okoznak. A vizsgálatot követően 24 – 48 órával, illetve szükség esetén tovább 72 – 92 órával vérvételek szükségesek a vesefunkció megítélése céljából. A vérvételekre a beutalót az Ön számára a vizsgálatot kérő orvos fogja biztosítani, a vért a Laboratórium munkatársai veszik le, a vizsgálati eredményt pedig a vérvétel másnapján a vizsgálatot kérő orvossal fogja megkonzultálni.

<b>CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁR HELY - MAKÓ</b>	Betegtájékoztató
	<b>INTRAVÉNÁS KONTRASZTANYAG ADÁS CSÖKKENT VESEFUNKCIÓJÚ BETEGEK SZÁMÁRA</b>

2. **Nem történhet meg a vizsgálat:**  
Ha ön feltételezett vagy biztos *terhes*.
3. **Kontrasztanyag érzékenység:**  
Amennyiben korábbi vizsgálatkor Önnek vénába adott jódos kontrasztanyagra érzékenységi reakciója volt, kérjük a vizsgálat előtt ezt külön jelezze!
4. **A vizsgálat előtt:**  
*A vizsgálat előtt 4 órával nem ehet*, viszont a vizsgálat napján fogyasszon sok buborékmentes folyadékot. Ez feltétlenül fontos has-kismedencei CT vizsgálat esetén, mert a tápcsatorna kirajzolására 1 liter kontrasztanyagot kell majd meginnia a röntgenben.
5. **Ha Ön cukorbeteg:**  
Ha cukorbetegség miatt *metformin* hatóanyagú gyógyszert szed ( ADEBIT, ADIMET, COMPETACT, EUCREAS, GLUFORMIN, HUMA-METFORMIN, JANUMET, MEFORMIN, MEFORAL, MEGLUCON, MERKFORMIN, METFORFMIN 1, APHARMA, AUROBINDO, METFORMIN BLUEFISH, METFORMIN MYLAN, METFORMIN HEXAL, METFORMIN-TEVA, METFORGAMMA 850, METGLUCON, METRIVIN, MERTRIVIN, NORMAGYLC, STADAMET, SIOFOR, VELMETIA) a vizsgálat előtt 2 napig és utána 2 napig **NEM VEHETI BE**, Ennek részleteit beszélje meg kezelőorvosával. *Egyéb gyógyszereit beveheti.*
6. **Korábbi leletek:**  
Kérjük, hozza magával más intézetben készült leleteit, CD lemezét (lemezeit), zárójelentéseit.
7. **Laborértékek:**  
A CT vizsgálat elvégzéséhez, a kontrasztanyag adásához a vesefunkciós értékeire (kreatinin, karbamid) is szükség van, ezért kérjük, hozza el legutolsó labor leletét.
8. **Nem tud megjelenni az előjegyzés időpontjában:**  
Amennyiben a megadott időpontban nem tud a vizsgálatra eljönni, kérem, értesítse a Radiológiai Osztályt az alábbi telefonszámon, és szükség esetén egyeztessen új időpontot. Munkanapon: 532-274 telefonon, 8-15 óra között.

Jelen tájékoztató csak az intravénás kontrasztanyag adásával kapcsolatos vesekárosodásra vonatkozóan nyújt információt. A kontrasztanyaggal kapcsolatos egyéb információkat a vizsgálat előtt a Radiológiai osztály biztosítja majd Ön számára. Ha maradt valamilyen kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban, tegye fel a vizsgálatot kérő orvosának vagy az asszisztenseknek.

Radiológiai Osztály  
CSMEK Hódmezővásárhely-Makó