

<p style="text-align: center;">CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ</p>	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	VESECYSTA, VESECYSTÁK

Kedves Betegünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is alátámasztottak – „Vesecysta, vesecysták műtéte”-t szükséges elvégezni!

1. A műtét célja:

Vesecysta, vesecysták (Vékony kötőszövetes fallal bíró hólyag) kezelése műtéti megoldást tesz szükségessé.

Nagy vesecysták tünetekkel járhatnak (deréktáji fájdalom, véres vizelet, gyomor-bél panaszok, vizelettranszport mechanizmusát zavarhatja).

2. A műtét elmaradásának következménye:

A panaszok tovább fennállnak, vagy fokozódnak.

3. A műtét eredménye:

A fenti panaszok megszűnnek.

4. A műtét ismertetése:

Műtéti típusok:

4.1. I. felállásból bőrön ejtett metszés:

A cysta falának eltávolítása. Műtét után 1-2 napig a vese mellé drain kell.

A beavatkozáshoz altatás szükséges.

Lehetséges szövődmény: 1. altatással kapcsolatos,

2. műtéti beavatkozással kapcsolatos (vérzés, fertőzés).

4.2. Punkció:

Helyi érzéstelenítés után UH-célzással a cysta falának átszúrásával a folyadék leszívása, ezt követően a folyadék helyébe gyulladást keltő anyag befecskendezése a cysta kiújulásának csökkentése érdekében.

Beavatkozás hátránya:

Nem minden cysta férhető hozzá a punkció számára. Nagy a kiújulás lehetősége.

Szövődmény: vérzés, fertőzés, esetleg a vese eltávolítása.

4.3. Cystafal rezekció: falának részleges eltávolítása endoszkóp segítségével.

Érzéstelenítés: gerinc (spinalis)

Műtét menete:

Bőrön keresztül a cysta megszúrása. A szúrcsatorna feltágítása kb. 1 cm átmérőjűre.

Endoszkóp bevezetése, amellyel a cysta falának egy részét eltávolítjuk.

A beavatkozás előnye:

A kiújulás lehetősége kicsi, nem jár izomátvágással.

Hátrány:

Nem minden cysta férhető hozzá az endoszkóp számára.

Szövődmény: vérzés, fertőzés.

CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	VESECYSTA, VESECYSTÁK

5. **Gyógyulás:**

Szövődménymentes esetben 3-5 nap.

6. **A műtét lehetséges szövődményei:**

Vérzés, sebfertőzés, időleges vizeletcsorgás, vesesérülés esetén a vese eltávolítása, kiújulás.

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenként más szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük.

A felsorolt szövődmények ritkák, de a leggondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.

A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja!

Dr. Kovács Endre
urologus főorvos